

**Título:** TRASTORNOS DE LA DEGLUCION EN EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR AGUDO.

**Nombre:** CAMACHO CUARTERO JOSE MANUEL

**Universidad:** Universidad Complutense de Madrid

**Fecha de lectura:** 01/01/1997

**Programa de doctorado:** DESCONOCIDO

**Dirección:**

> **Director:** LUIS VALDIVIESO VARELA

**Tribunal:**

> **presidente:** ÁNGEL DEL PALACIO PÉREZ-MEDEL

> **secretario:** GUTIERREZ RIVAS EDUARDO JOSE

> **vocal:** JORGE MATIAS GUIU

> **vocal:** FERNANDO ARNAIZ BUENO

> **vocal:** JUAN JESÚS VILCHEZ PADILLA

**Descriptor:**

> CIENCIAS MEDICAS

> MEDICINA INTERNA

> NEUROLOGIA

> PATOLOGIA

> NEUROLOGIA

**El fichero de tesis** no ha sido incorporado al sistema.

**Resumen:** FUNDAMENTOS. EN LOS ACCIDENTES VASCULARES CEREBRALES (AVC) SON COMUNES LAS ALTERACIONES DE LA DEGLUCION, PERO SU FRECUENCIA, HISTORIA NATURAL, CONSECUENCIAS Y FACTORES DE RIESGO SON MAL CONOCIDOS.

MATERIAL Y METODOS. ESTUDIO CLINICO Y NEURORADIOLOGICO, DESCRIPTIVO Y ANALITICO, DE 167 PACIENTES CON AVC EN UN AÑO EN UN HOSPITAL COMARCAL.

RESULTADOS. 36.4% DE PACIENTES CON DISFAGIA A LIQUIDOS EN LA PRIMERA VALORACION. DISFAGIA A SEMISOLIDOS CON IGUAL FRECUENCIA PERO MAYOR GRADO. EVOLUCION: ENTRE 68 DISFAGICOS, A LOS 6 MESES: 55.8% DISFAGIA RESUELTA, 39.7% FALLECIDOS, 4.4% CON DISFAGIA. AUMENTO DEL RIESGO DE

INFECCION RESPIRATORIA Y MUERTE. FACTORES DE RIESGO PARA DISFAGIA: ALTERACION DE CONCIENCIA, DEFICIT FUNCIONAL Y MOTOR, LOCALIZACION HEMISFERICA IZDA. ESPECIALMENTE ANTERIOR Y VOLUMEN DE LA LESION AGUDA. FACTORES DE RIESGO DE RESOLUCION TARDIA: GRADO DE DISFAGIA INICIAL Y VOLUMEN DE LA LESION AGUDA Y RESIDUAL.

CONCLUSIONES. LA DISFAGIA EN EL AVC ES FRECUENTE, MAS INTENSA PARA LIQUIDOS, CON BUEN PRONOSTICO DE RECUPERACION AUNQUE CON ALTA MORTALIDAD. SU APARICION DEPENDE DEL TAMAÑO DE LA LESION AGUDA Y EN PARTE DE SU LOCALIZACION Y EN SU PRONOSTICO DE RESOLUCION INFLUYEN TANTO LAS LESIONES AGUDAS COMO LAS RESIDUALES.