

Título: ANALISIS CLINICO DE 1061 PACIENTES CON INFECCION VIH: 1984-1996

Nombre: MOLINERO HELGUEDAS, DELFINA

Universidad: Universidad de Valladolid

Departamento: MEDICINA

Fecha de lectura: 28/04/2000

Programa de doctorado: MEDICINA

Dirección:

> **Director:** POZO PEREZ MIGUEL ANGEL DEL

> **Codirector:** AIRAS MAYORGA JORGE RAUL

Tribunal:

> **presidente:** ANTONIO JIMENO CARRUEZ

> **secretario:** OJEDA ORTEGO JOSE J.

> **vocal:** ALFREDO BLANCO QUIROS

> **vocal:** MIGUEL CORDERO SANCHEZ

> **vocal:** JAIME TORIBIO PEREZ

Descriptores:

> CIENCIAS MEDICAS

> CIENCIAS CLINICAS

> SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA

> PATOLOGIA

> PATOLOGIA CLINICA

El fichero de tesis no ha sido incorporado al sistema.

Localización: VALLADOLID

Resumen: Es una patología dinámica como lo es la infección VIH, de interés la actualización de los conocimientos en nuestra área sanitaria y su aplicación práctica en la actividad clínica diaria. Como hipótesis de trabajo. Se pretende actualizar los cambios --- en la infección por VIH en los últimos años. Para ello se lleva a cabo un análisis retrospectivo con la recogida de datos sistemática en nuestro centro, de la asistencia a parientes adultos con infección por VIH, destacando los siguientes interrogantes: ¿cuál ha sido la evolución epidemiológica y clínica de la infección por VIH a nivel local?, ¿Cómo ha influido la clasificación actual CDC-93 y cuál ha sido el impacto de los meros tratamientos en el curso evolutivo de la serie?.

Se describe de forma retrsoepctiva 765 hombres y 296 mujeres con infecciónVIH documentada, atendidos entre mayor de 1984 y diciembre de 1996.

Se utilizan diversos métodos estadísticos en el estudio, análisis descriptivos (transversales y ---) y analíticos (análisis univariantes sobre el riesgo relativo de progresión a SIDA, multivariable de factores clínicos, epidemiológica y biológica, análisis de la probabilidad --- de supervivencia).

Dentro de las conclusiones más importantes observamos que el ritmo de porgresión de la infección ha descendido, con una caída del 68% entre 1992 y 1996, se mantiene la preferencia por el mismo grupo de edad, aumenta en mujeres y por mecanismo heterosexual, siendo el porcentaje de usuarios de drogas inyectadas superior a otras áreas. Las patologías más frecuentes fueron las infecciones oportunistas, en relación con el deterioro inmune.